

INSTRUCCIONES POST-OPERATORIAS

La siguiente información se proporciona para ayudarla a usted y a su hijo después de que haya recibido tratamiento dental de rutina en nuestra oficina. Las áreas marcadas indican tratamiento (s) específico (s) brindado (s) a su hijo.

- Anestésico local** - Anestésico local se utiliza durante el tratamiento dental de su hijo. Como resultado, su boca se "entumecerá" por aproximadamente 2 horas. **Mírelos de cerca para asegurarse de que su hijo no muerda, rasque ni lastime la mejilla, los labios o la lengua.** Algunos niños se ponen muy molestos (incluso llorando) y se quejan de dolor cuando se dan cuenta de que su boca se siente "diferente". ¡Por favor, no se alarmen! Muchos niños no están familiarizados con esta sensación de entumecimiento y la asocian con dolor. Asegúrele a su hijo que la "sensación divertida" desaparecerá en aproximadamente 2 horas.

- Selladores** - Selladores se colocan en los dientes sin el uso de anestesia local. Es posible que su hijo sienta que sus dientes no encajan adecuadamente por unos días. Se debe evitar el crujido de hielo y el consumo de alimentos pegajosos, como los dulces, ya que podría desalojar o romper el sellador. Comprobaremos los selladores en cada examen. La longevidad del sellador se basa en la dieta y las prácticas de higiene.

- Enameloplastia** : el contorno del esmalte se indica en las siguientes situaciones: (1) para evitar que una cavidad muy pequeña se agrande (2) para corregir una erupción ectópica (3) para corregir el apiñamiento leve.

- Rellenos dentales** : después de la colocación de los empastes dentales, los dientes a menudo pueden ser sensibles al calor, al frío y a la presión durante un breve período de tiempo. No es raro que los dientes llenos recientemente requieran varias semanas para sentirse "normales" nuevamente.

- Coronas de acero inoxidable** : los dientes de su hijo han sido cubiertos con una corona de acero inoxidable que se ha adaptado al diente, lo cubre por completo y protege el diente, lo que le permite a su hijo mantener ese diente hasta que se caiga de manera natural. El tejido de las encías que rodea el diente puede parecer que está sangrando. ¡Esto es normal! Al preparar el diente de su hijo para una corona, es necesario ajustar la corona de cerca al tejido de la encía, lo que provoca hemorragias y hematomas del tejido. Después de la colocación de las coronas, algunos padres notarán un color púrpura o gris alrededor de las encías; esto también es normal y desaparecerá con el tiempo. El cepillado continuo de la corona y los tejidos de las encías promoverá la cicatrización.

- Pulpotomía** : cuando su hijo recibe un tratamiento nervioso, generalmente **no es** necesario recetar ningún medicamento para el dolor. Los niños que experimentan malestar generalmente lo hacen bien con Tylenol o Ibuprofeno (siga las instrucciones en la botella).

- Extracciones dentales** : después de las extracciones dentales, se colocarán compresas de gasa para controlar la hemorragia normal en el sitio de la extracción. La mayoría de las extracciones dentales son de rutina y es poco probable que su hijo necesite algún analgésico o antibióticos . Los niños que

experimentan malestar generalmente lo hacen bien con Tylenol o Ibuprofeno (siga las instrucciones en la botella). No permita que su hijo succione de una pajita o beba bebidas carbonatadas para 48 horas: esto puede prolongar el sangrado debido a la interrupción del proceso de coagulación sanguínea normal.

Óxido nitroso - Oxígeno - Se usó "gas reír" durante la cita dental de su hijo. El óxido nitroso tiene un historial comprobado de ser muy seguro, ya que proporciona un alivio excepcional de la ansiedad y el único efecto secundario son las náuseas, pero solo en raras ocasiones.

Hinchazón y dolor : la hinchazón y el malestar leves son acontecimientos normales después de algunos procedimientos dentales. Cualquier hinchazón importante o dolor moderado a severo necesita la atención de la oficina dental para que pueda ser manejada adecuadamente.

Dieta y otras limitaciones : después del tratamiento dental, especialmente las extracciones dentales, la dieta de su hijo debe consistir inicialmente en alimentos blandos (gelatina, pudín, batidos) y bebidas claras no carbonatadas (agua, jugo, Gatorade). Evite comer alimentos crujientes o pegajosos.

Llámenos con preguntas: 406-587-KIDS (54 37) Marque 3 para que la celda del Dr. A deje un mensaje con ella.

